

# Ayrshire

## Analyse de conformation - Femelle

<b>Nom/n° d'étable</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>Date de la visite</b>		
<b>N° d'enregistrement</b>	<b>N° d'enregistrement du père</b>	<b>Date de naissance</b>	<b>Date de vêlage</b>	<b>N° de lactation</b>

Section	Pointage	Caractères descriptifs	Caractères défectifs
---------	----------	------------------------	----------------------

<b>Croupe</b> (10 %)		Angle de la croupe (30 %) haut	1 2 3 4 5 6 7 8 9	bas	<b>10</b> Anus avancé <sub>2</sub>	<b>13</b> Att. queue haute <sub>1</sub>
		Largeur aux ischions (30 %) étroite	1 2 3 4 5 6 7 8 9	large	<b>11</b> Att. queue avancée <sub>1,5</sub>	<b>15</b> Mauvaise inclin. Bassin <sub>0</sub>
		Force du rein (25 %) faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9	fort	<b>12</b> Att. queue rentrante <sub>1</sub>	
		Position du trochanter (15 %) reculé	1 2 3 4 5 6 7 8 9	avancé		

<b>Système mammaire</b> (40 %)		Plancher de pis (4 %) Incliné	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Incliné vers l'avant	<b>22</b> Avant-pis court <sub>1</sub>	<b>26</b> Quartier improductif <sub>8</sub>
		Profondeur du pis (11 %) profond	1 2 3 4 5 6 7 8 9	peu prof.	<b>23</b> Arr.-pis court <sub>1</sub>	<b>27</b> Trayon double <sub>1,5</sub>
		Texture du pis (15 %) charnu	1 2 3 4 5 6 7 8 9	souple	<b>24</b> Manque de forme <sub>1</sub>	<b>28</b> Trayons av. trop arr. <sub>0,5</sub>
		Suspension médiane (13 %) faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9	forte	<b>25</b> Quartier non équilibré <sub>1</sub>	<b>29</b> Trayons arr. trop arr. <sub>0,5</sub>
		Attache avant (15 %) faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9	forte		
		Position trayons avant (5 %) éloignés	1 2 3 4 5 6 7 8 9	rapprochés		
		Hauteur attache arrière (13 %) basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9	haute		
		Largeur attache arrière (13 %) étroite	1 2 3 4 5 6 7 8 9	large		
		Position trayons arrière (7 %) éloignés	1 2 3 4 5 6 7 8 9	rapprochés		
Longueur des trayons (4 %) courts	1 2 3 4 5 6 7 8 9	longs				

<b>Puissance laitière</b> (25 %)		Stature (10 %) courte	1 2 3 4 5 6 7 8 9	grande	<b>42</b> Côtes av. peu prof. <sub>1,5</sub>	<b>45</b> Cotes peu arquées <sub>1,5</sub>
		Hauteur à l'avant-train (3 %) basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9	haute	<b>43</b> Arr. épaule faible <sub>1</sub>	<b>46</b> Manque d'agencem. <sub>1</sub>
		Largeur du poitrail (22 %) étroit	1 2 3 4 5 6 7 8 9	large	<b>44</b> Dos faible <sub>1,5</sub>	<b>48</b> Tête Indésirable <sub>1</sub>
		Profondeur du corps (22 %) peu prof.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	profond		
		Capacité laitière (28 %) ible capacité	1 2 3 4 5 6 7 8 9	grande capacité		
		Cote de chair (2 %) basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9	haute		
		Texture du pis (6 %) Force du rein (10 %)				

<b>Pieds et membres</b> (25 %)		Angle du pied (13 %) bas	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Incliné	<b>30</b> anormalité de pince <sub>1,5</sub>	<b>34</b> Raideur <sub>3</sub>
		Profondeur du talon (25 %) peu prof.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	profond	<b>31</b> Paturons faibles <sub>1,5</sub>	<b>35</b> Membres arrière reculés <sub>1,5</sub>
		Valeur combinée du pied (recherche fonctionnelle)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	non fonctionnelle	<b>32</b> Jarrets gonflés <sub>1</sub>	<b>36</b> Pieds avant ext. <sub>1</sub>
		Qualité de l'ossature (12 %) grossière	1 2 3 4 5 6 7 8 9	raffinée	<b>33</b> Manque d'os <sub>0</sub>	
		Vue côté-membres arrière (15 %) droits	1 2 3 4 5 6 7 8 9	écoudés		
		Vue arrière membres (30 %) vers l'int.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	droits		
		Vue avant des membres avant (recherche cagneux)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	genoux arqués		
		Locomotion (recherche) non mobile	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mobile		
Position du trochanter (5 %)						

<b>Classe</b>	<b>Pointage</b>	<b>Commentaires :</b>
---------------	-----------------	-----------------------